A V E R T I S S E M E N T S A G R I C O L E S

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST (Tél. Arras 23-14)

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux.

C. C. P. . LILE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL
12 N F

Supplément nº 1

nº XXIII - 20 Aout 1962 -

- MILDIOU DE LA PONME DE TERRE -

L'évolution de la maladie est cette année tardive et lente. Les cultures traitées correctement suivant nos précédents avis à la mi-juillet et début-acut ont été bien protégées. Cependant à la suite des pluies du 14 au 17 acut, des contaminations ont pu se produire qui se manifesteront par une nouvelle apparition de taches vers le 20 - 22 acut.

Il convient donc de surveiller attentivement les cultures et si cette apparition se confirme d'effectuer une des deux opérations suivantes :

- Soit <u>détruire le feuillage</u> pour éviter les contaminations éventuelles de tubercules dans le cas de cultures proches de la maturité.
- Soit <u>affectuer un traitement foncioide</u> afin d'éviter l'extension de ces foyers dans le cas de cultures tardives où l'on désire conserver un feuillage actif après le ler septembre.

- CARPOCAPSE -

OULTURES FRUTTERES

Le premier vol ayant été très tardif, il semble que cette armée, le deuxième vol ne soit pas à craindre et il sera imutile d'intervenir.

- TAVELURE -

Il est prudent d'effectuer un traitement fongloide soigné pour éviter les contaminations tardives sur fruits sensibles. Cette opération est également très utile dans les vergers de poiriers pour éviter les attaques sur jeunes rameaux.

Le Contrôleur chargé dess Avertissements Agricoles, L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

R. DIVOUX

P. COUTURIER